



吡罗昔康片

消炎 止痛 解热


PIROXICAM TABLETS

缓
解
各
种
关
节
炎
及
软
组
织
病
变
的
疼
痛
和
肿
胀

[规格] (1) 10mg (2) 20mg

[成份] 本品主要成份为吡罗昔康。

化学结构式：



[适应症]

用于缓解各种关节炎及软组织病变的疼痛和肿胀的对症治疗。

[药理作用]

非甾体抗炎药，具有镇痛、抗炎及解热作用。通过抑制环氧合酶使组织局部前列腺素的合成减少，抑制白细胞的趋化性和溶酶体酶的释放而发挥药理作用。

痛风发作期间，可减轻渗出、水肿、毛细血管扩张等炎症反应，从而改善关节的红肿热痛症状。

[用法用量]

口服。成人常用量：一次20mg，一日1次，或一次10mg，一日2次。饭后服用。

[毒理]


急性毒性试验结果：小鼠经口LD50为360mg/kg。

[不良反应]

1. 恶心、胃痛，纳减及消化不良等胃肠不良反应。2. 中性粒细胞减少、嗜酸粒细胞增多、血尿素氮增高、头晕、眩晕、耳鸣、头痛、全身无力、水肿，皮疹或瘙痒等。3. 肝功能异常、血小板减少、多汗、皮肤瘀斑、脱皮、多形性红斑、中毒性上皮坏死、大疱性多形红斑(Stevens-Johnson综合征)，皮肤对光过敏反应、视力模糊、眼部红肿、高血压、血尿、低血糖，精神抑郁，失眠及精神紧张等。

[禁忌]

对本品过敏、消化性溃疡、慢性胃病患者禁用。



精华制药

地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
ADD:NO.9 XINGTAI ROAD GANGZHA ZONE,NANTONG CITY,
JIANGSU PROVINCE,CHINA
电话(TEL): 0513-85609111 85609126
传真(FAX): 0513-85609115 邮编(POSTCODE): 226005
网址(WEB): <http://www.ntjhz.com>
E-mail: ntjh@jhoa.net



吡罗昔康片

消炎 止痛 解热

PIROXICAM TABLETS

缓
解
各
种
关
节
炎
及
软
组
织
病
变
的
疼
痛
和
肿
胀

[注意事项]

1. 交叉过敏。对阿司匹林或其他非甾体抗炎药过敏的患者，对本品也可能过敏。2. 饭后给药或与食物或抗酸药同服，以减少胃肠刺激。3. 一日量超过20mg时，发生胃肠溃疡的危险明显增加。4. 用药期间如出现过敏反应、血象异常、视力模糊、精神症状、水潴留及严重胃肠反应时，应立即停药。5. 下列情况应慎用：①有凝血机制或血小板功能障碍时；②哮喘；③心功能不全或高血压；④肾功能不全；⑤老年人。6. 能抑制血小板聚集，作用比阿司匹林弱，但可持续到停药后2周。术前和术后应停用。

[药物相互作用]

1. 饮酒或与其他抗炎药同服时，胃肠道不良反应增加。2. 与双香豆素等抗凝药同用时，后者效应增强，出血倾向显著，用量宜调整。3. 与阿司匹林同用时，本品的血药浓度可下降到一般浓度的80%，同时胃肠道溃疡形成和出血倾向的危险性增加。

[孕妇及哺乳期妇女用药]

1. 孕妇禁用。2. 可引起乳汁分泌减少，哺乳期妇女不宜用。

[药代动力学]

口服吸收好。食物可降低吸收速度，但不影响吸收总量。血浆蛋白结合率高达90%以上。经肝脏代谢。t_{1/2}平均为50小时(30~86小时)，肾功能不全患者t_{1/2}延长。由于半衰期较长，一次给药即可维持24小时的血药浓度相对稳定，多次给药易致蓄积。一次服药20mg，3~5小时血药浓度达峰值，血药有效浓度为1.5~2μg。血药稳定浓度在开始治疗后7~12天方能达到。

66%自肾脏排泄，33%自粪便排泄，内有<5%为原形物。

[包装] 玻璃瓶或塑料瓶装，每瓶25片、50片或100片。

[有效期] 24个月

[执行标准] 《中国药典》2015年版2部

[批准文号] 国药准字 H32026330



精华制药

地址：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
ADD:NO.9 XINGTAI ROAD GANGZHA ZONE,NANTONG CITY,
JIANGSU PROVINCE,CHINA
电话(TEL): 0513-85609111 85609126
传真(FAX): 0513-85609115 邮编(POSTCODE): 226005
网址(WEB): <http://www.njthzy.com>
E-mail: njth@jhoa.net